

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET  
EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT**

**RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT**

**PrCEPHALEXIN - 500**

Comprimés de céphalexine USP

500 mg

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre CEPHALEXIN - 500 et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de CEPHALEXIN - 500.

**Pourquoi CEPHALEXIN - 500 est-il utilisé?**

- CEPHALEXIN - 500 est utilisé pour le traitement de certaines infections des:
  - voies respiratoires;
  - oreilles (l'otite moyenne);
  - voies génito-urinaires;
  - os et des articulations;
  - peau et des tissus mous
- Les antibactériens tels que CEPHALEXIN - 500 sont destinés uniquement au traitement des infections bactériennes. Ils ne doivent pas être employés pour traiter les infections virales tels que le simple rhume.

**Comment CEPHALEXIN - 500 agit-il?**

CEPHALEXIN - 500 est un antibactérien qui :

- arrête la croissance des bactéries
- tue les bactéries

**Quels sont les ingrédients de CEPHALEXIN - 500?**

Ingrédients médicinaux: Céphalexine

Ingrédients non-médicinaux :

Acide stéarique, AD&C jaune no 6, cellulose microcristalline, dioxyde de silice colloïdal, dioxyde de titane, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol de stéarate de magnésium,

**CEPHALEXIN - 500 est offert sous les formes posologiques qui suivent :**

**Comprimés de 500 mg:** Offerts en bouteilles de 100 et de 500 comprimés.

**Ne prenez pas CEPHALEXIN - 500 si:**

- êtes allergique à la céphalexine, aux antibiotiques de la famille des céphalosporines ou à tout autre ingrédient de CEPHALEXIN - 500

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre CEPHALEXIN - 500, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament.**

**Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :**

- vous êtes allergique ou réagissez mal aux pénicillines ou à d'autres antibiotiques
- vous avez des problèmes de foie
- vous avez des problèmes rénaux
- vous êtes enceinte ou planifiez de l'être

- vous allaitez où planifier de le faire
- Autres mises en garde qu'il faudrait savoir :
- L'utilisation d'un antibiotique tel que CEPHALEXIN - 500 peut causer la maladie associée à la Clostridium difficile (MACD). Voir « Effets secondaires graves », plus bas.
  - CEPHALEXIN - 500 peut interférer avec certains résultats de test urinaires ou sanguins. Parler avec votre médecin si vous avez eu un test sanguin ou urinaire lors de la prise de CEPHALEXIN - 500.

**Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.**

**Comment prendre CEPHALEXIN - 500:**

- Prendre CEPHALEXIN - 500 oralement l'estomac vide.
- Même si votre état s'améliore au début du traitement, vous devez utiliser CEPHALEXIN - 500 exactement comme il vous a été prescrit.
- Une utilisation incorrecte ou excessive de CEPHALEXIN - 500 pourrait causer la croissance de bactéries qui ne seront pas tuées par CEPHALEXIN - 500 (résistance). Cela signifie que CEPHALEXIN - 500 pourrait ne plus être efficace pour vous plus tard.
- Ne pas partager votre médicament.

**Dose habituelle:**

**Adultes:**

La dose pour un adulte varie entre 1 et 4 g par jour, en doses fractionnées. La dose normale pour un adulte est de 1 g par jour et est administrée en doses fractionnées à toutes les 6 heures.

**Enfants:**

La dose quotidienne recommandée pour les enfants est de 25 à 50 mg/kg/jour en doses fractionnées à toutes les 6 heures.

**Surdosage:**

Les symptômes d'un surdosage lors de l'administration par voie orale peuvent inclure:

- nausée
- vomissements
- douleurs abdominales
- diarrhée
- sang dans l'urine

Si vous croyez avoir pris trop de CEPHALEXIN - 500, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.

**Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à CEPHALEXIN - 500?**

Ceux-ci ne sont pas tous les effets secondaires possibles lors de la prise de CEPHALEXIN - 500. Si vous ressentez un effet indésirable qui n'est pas mentionnés, veuillez contacter votre professionnel de la santé.

Il est possible que vous présentiez des symptômes tels que diarrhée, nausées, vomissements, selles liquides, douleurs abdominales, érythème fessier, inflammation vaginale, étourdissements, fatigue, maux de têtes, agitation, confusion, hallucinations ou encore d'autres symptômes que vous ne comprenez pas. Dans ces cas, informez-en votre médecin aussitôt que possible si vous ressentez n'importe lequel de ces symptômes.

Des cas de vertiges (perte d'équilibre ou instabilité), acouphènes (bourdonnement dans l'oreille), perte auditives ou changement du comportement ont été reportés chez les jeunes enfants.

CEPHALEXIN - 500 peut causer les effets de jaunissement du blanc des yeux ou de la peau (ictère) ou une inflammation du foie (hépatite) s'accompagnant de symptômes tels que douleurs abdominales, vomissements et des nausées.

<b>Effets secondaires graves</b>			
<b>Symptôme / effet</b>	<b>Parlez à votre professionnel de la santé</b>		<b>Cessez de prendre le médicament et obtenez des conseils médicaux sans tarder</b>
	<b>Dans les cas sévères seulement</b>	<b>Dans tous les cas</b>	
<b>RARE</b>			
Symptômes d'une inflammation de l'intestin sévère (colite due à la Clostridium difficile) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• diarrhée persistante</li> <li>• diarrhée liquide ou avec du sang</li> <li>• douleurs/crampes abdominales ou de l'estomac</li> <li>• selles contenant du sang/mucus</li> </ul>			√
Réactions cutanées sévères : <ul style="list-style-type: none"> <li>• éruptions cutanées, qui peut causer des ampoules et ressemble a de petites cibles (tache au centre foncé entourée d'une région plus pale avec un anneau foncé au bord)</li> <li>• éruptions cutanée large avec des ampoules et de la peau qui s'effrite sur la plupart des régions du corps particulièrement autour de la bouche, du nez, des yeux et des parties génitales</li> </ul>			√
Réactions indésirables cutanées graves (SCAR) (réaction cutanée graves pouvant également toucher d'autres organes): <ul style="list-style-type: none"> <li>• la peau qui pèle, desquamation ou formation de cloques (avec ou sans pus) pouvant</li> </ul>			√

<p>également affecter les yeux, la bouche, le nez ou les organes génitaux, démangeaisons, éruption cutanée grave, bosses sous la peau, douleurs cutanées, changements de couleur de la peau (rougeurs, jaunissement, violacé)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gonflement et rougeur des yeux ou du visage</li> <li>• sensation de grippe, fièvre, frissons, courbatures, ganglions enflés, toux</li> <li>• essoufflement, douleur à la poitrine ou malaise</li> </ul>			
--	--	--	--

Si vous avez des symptômes ou des effets secondaires qui ne sont pas présents dans la liste cidessus ou qui commencent à affecter vos activités quotidiennes, veuillez contacter votre professionnel de la santé.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associé avec l'utilisation d'un produit de santé par:

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

#### **Entreposage:**

#### **Comprimés :**

Conserver à la température ambiante (15°C et 30 °C). Délivrer dans un contenant hermétique. À l'abri de la lumière, car une exposition prolongée à la lumière peut causer une décoloration de l'enrobage.

**Pour en savoir davantage au sujet de CEPHALEXIN - 500 vous pouvez :**

- Communiquez avec votre professionnel de la santé;
- Vous pouvez obtenir la monographie de produit complète préparée à l'intention des professionnels de la santé (qui contient les renseignements sur le médicament destinés aux patients), en visitant le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche>) ou en communiquant avec Pro Doc Ltée au 1-800-361-8559, [www.prodoc.qc.ca](http://www.prodoc.qc.ca) ou [info@prodoc.qc.ca](mailto:info@prodoc.qc.ca).

Ce dépliant a été préparé par  
Pro Doc Ltée, Laval, Québec, H7L 3W9

Date de révision : 28 mai 2021