

**LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT**

**RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT**

**PrCLOPIDOGREL  
Comprimés de clopidogrel USP**

Veillez lire attentivement le présent dépliant avant de commencer à prendre **CLOPIDOGREL**, puis chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il existe de nouveaux renseignements au sujet de **CLOPIDOGREL**.

**Pourquoi CLOPIDOGREL est-il utilisé?**

- CLOPIDOGREL est utilisé chez les adultes pour aider à prévenir les caillots sanguins et réduire le risque de souffrir de troubles causés par des caillots sanguins (tels que les accidents vasculaires cérébraux, l'angine de poitrine instable [douleur à la poitrine au repos], les crises cardiaques ou les maladies artérielles périphériques [douleurs aux jambes lors de la marche ou au repos]).
- CLOPIDOGREL est également utilisé chez les adultes atteints de fibrillation auriculaire (battements cardiaques irréguliers) et ne pouvant pas prendre de médicaments appelés anticoagulants oraux.

**Comment CLOPIDOGREL agit-il?**

CLOPIDOGREL appartient à un groupe de médicaments appelés médicaments antiplaquettaires. Les plaquettes sont de très petites structures dans le sang qui s'agglutinent pendant la coagulation du sang. Les médicaments antiplaquettaires comme CLOPIDOGREL aident à prévenir cette agglutination et à réduire le risque de formation de caillots sanguins.

**Quels sont les ingrédients de CLOPIDOGREL?**

Ingrédient médicamenteux: bisulfate de clopidogrel

Ingrédients non médicinaux: crospovidone, dioxyde de titane, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, lactose anhydre, méthylcellulose, oxyde de fer rouge, polyéthylène glycol, silice colloïdale et stéarate de zinc.

**CLOPIDOGREL est offert sous les formes posologiques suivantes:**

Comprimés de 75 mg

**Ne prenez pas CLOPIDOGREL si vous:**

- êtes allergique au bisulfate de clopidogrel ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés;
- prenez du répaglinide, un médicament utilisé pour abaisser la glycémie;
- êtes atteint d'une affection médicale qui peut causer des saignements, comme un ulcère d'estomac;
- avez des problèmes de foie.

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre CLOPIDOGREL, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si vous :**

- êtes atteint d'une affection médicale qui cause des saignements, comme un ulcère d'estomac, ou d'un

trouble sanguin qui vous fait saigner plus facilement ou lié à une tendance à saigner pendant plus de 10 minutes sans prendre de médicaments;

- prenez d'autres médicaments, comme les suivants :
  - l'acide acétylsalicylique (AAS)
  - d'autres médicaments utilisés pour réduire la formation de caillots sanguins, comme la warfarine, l'héparine, l'abciximab, l'eptifibatide et le tirofiban
  - des antidépresseurs oraux (inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine ou ISRS), comme la fluvoxamine et la fluoxétine
  - des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), utilisés pour traiter les affections douloureuses et/ou inflammatoires touchant les muscles ou les articulations
  - des médicaments utilisés pour traiter les ulcères d'estomac et l'acidité gastrique, comme l'oméprazole
  - la rifampicine, un antibiotique utilisé pour traiter les infections graves
- avez des problèmes de reins;
- êtes enceinte ou devenez enceinte pendant que vous prenez CLOPIDOGREL;
- allaitez;
- avez récemment subi une intervention chirurgicale (y compris une intervention dentaire) ou prévoyez en subir une bientôt. Votre professionnel de la santé pourrait vous demander d'arrêter la prise de CLOPIDOGREL pendant 5 à 7 jours avant l'intervention;
- avez des allergies à des médicaments, y compris au prasugrel ou à la ticlopidine;
- présentez une intolérance au lactose ou l'une des maladies héréditaires rares ci-dessous :
  - Intolérance au galactose
  - Déficiência en lactase de Lapp
  - Malabsorption du glucose-galactose

parce que le lactose fait partie des ingrédients non médicinaux de CLOPIDOGREL.

### **Autres mises en garde à connaître:**

CLOPIDOGREL n'est pas recommandé chez les enfants ni chez les adolescents de moins de 18 ans.

Si vous présentez un saignement excessif pendant votre traitement par CLOPIDOGREL, ne cessez pas de le prendre, mais allez voir votre professionnel de la santé ou appelez-le sans tarder.

Si vous consultez un autre médecin ou un dentiste pendant le traitement par CLOPIDOGREL, vous devez lui signaler que vous prenez CLOPIDOGREL.

**Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels et les produits de médecine douce.**

### **Les produits qui suivent peuvent interagir avec CLOPIDOGREL:**

- l'aspirine (AAS), qui sert à traiter la douleur, la fièvre et l'inflammation;
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), utilisés pour traiter les affections douloureuses et/ou inflammatoires touchant les muscles ou les articulations;
- les opioïdes, utilisés pour traiter la douleur grave. Pendant votre traitement par CLOPIDOGREL, vous devez en informer votre professionnel de la santé avant de recevoir une ordonnance d'opioïdes;

- les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), comme la fluvoxamine et la fluoxétine, qui servent à traiter la dépression;
- d'autres médicaments utilisés pour réduire la formation de caillots sanguins, comme l'héparine, la warfarine, l'abciximab, l'eptifibatide et le tirofiban;
- les antiacides, comme l'oméprazole, utilisés pour traiter les indigestions ou les brûlures d'estomac;
- le répaglinide, utilisé pour abaisser la glycémie;
- le paclitaxel, utilisé pour traiter de nombreux types de cancers;
- la rifampicine, un antibiotique utilisé pour traiter les infections graves.

### **Comment prendre CLOPIDOGREL?**

Vous pouvez prendre CLOPIDOGREL avec ou sans nourriture. Vous devez prendre le médicament de façon régulière et à la même heure chaque jour.

Ce produit vous a été prescrit personnellement; n'en donnez pas à d'autres personnes. CLOPIDOGREL doit être pris à long terme, sous la supervision de votre professionnel de la santé.

### **Dose habituelle chez l'adulte:**

Vous devez prendre un comprimé CLOPIDOGREL de 75 mg par jour, par la bouche.

Si vous avez déjà présenté une angine de poitrine instable (douleur thoracique au repos) ou une crise cardiaque, vous pourriez recevoir une dose unique de 300 mg, suivie d'une dose d'un comprimé de 75 mg à prendre une fois par jour.

En présence de fibrillation auriculaire (battements cardiaques irréguliers), la dose habituelle de CLOPIDOGREL est de 75 mg une fois par jour en association avec de l'AAS à 75-100 mg une fois par jour.

### **Surdose:**

Si vous pensez que vous avez pris trop de CLOPIDOGREL (ou que la personne dont vous prenez soin a pris une dose trop élevée), communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

### **Dose oubliée:**

Si vous oubliez de prendre une dose de CLOPIDOGREL, mais que vous vous en rendez compte dans les 12 heures suivant l'heure de prise habituelle, prenez le comprimé oublié immédiatement et le comprimé suivant à l'heure habituelle. Si vous vous rendez compte de votre oubli plus de 12 heures après l'heure de prise habituelle, prenez simplement le comprimé suivant à l'heure habituelle. Ne prenez pas une double dose pour compenser celle qui a été oubliée.

Si vous utilisez le médicament présenté dans des plaquettes alvéolées, vous pouvez vérifier le jour où vous avez pris votre dernier comprimé de CLOPIDOGREL en regardant le calendrier imprimé au dos de la plaquette alvéolée.

## Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à CLOPIDOGREL?

Les effets secondaires possibles de CLOPIDOGREL ne sont pas tous énumérés ci-dessous. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Parmi les effets secondaires possibles, citons les suivants:

- Douleurs articulaires et/ou musculaires
- Douleur abdominale, diarrhée, indigestion (brûlures d'estomac)
- Nausées, vomissements, constipation, perte du goût, altération du goût
- Étourdissements, maux de tête
- Sensation de picotements dans les bras et/ou les jambes
- Éruption cutanée, démangeaisons
- Ecchymoses (bleus)
- Hypertrophie des tissus mammaires chez les hommes

Si vous vous coupez ou vous blessez, il faudra peut-être un peu plus de temps pour que le saignement s'arrête. En cas de coupure ou de blessure mineure (par exemple, si vous vous coupez en vous rasant), ce n'est pas grave. Toutefois, si vous avez des doutes, consultez votre professionnel de la santé sans tarder.

CLOPIDOGREL peut entraîner des résultats de tests sanguins anormaux. Votre professionnel de la santé déterminera le meilleur moment pour effectuer les analyses sanguines et interprétera les résultats.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Cas graves	Tous les cas	
<b>FRÉQUENT</b>			
Saignements de nez	✓		
<b>Troubles hémorragiques:</b> sang dans les selles, l'urine ou les yeux, vomissements de sang, toux accompagnée de crachats de sang, éruption cutanée avec taches violettes			✓
<b>Réaction allergique:</b> éruption cutanée, urticaire, enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer			✓
<b>PEU FRÉQUENT</b>			
Fièvre, signes d'infection, fatigue extrême			✓

<b>Maladie du foie:</b> jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d'appétit			✓
<b>Saignements dans le cerveau:</b> maux de tête soudains et intenses, faiblesse, perte de la parole ou de la vision, confusion, nausées, vomissements, crises convulsives, perte de conscience			✓
<b>TRÈS RARE</b>			
<b>Pneumonie à éosinophiles:</b> toux, fièvre, difficulté à respirer et sueurs nocturnes		✓	
<b>Syndrome de Kounis:</b> combinaison de symptômes et de signes de réaction allergique et de crise cardiaque ou d'angine instable, avec douleur thoracique, essoufflement, faiblesse, nausées, vomissements, évanouissements, démangeaisons, urticaire, transpiration forte et soudaine, pâleur inhabituelle, palpitations, tension artérielle basse, rythme cardiaque lent			✓
<b>FRÉQUENCE INCONNUE</b>			
<b>Hypoglycémie:</b> transpiration, tremblements, étourdissements, maux de tête, vision trouble		✓	

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ci-dessus ou qui s'aggrave suffisamment pour nuire à vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé.

### **Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation de produits de santé à Santé Canada:

- en visitant le site Web consacré à la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur; ou
- en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne fournit pas d'avis médical.*

**Conservation:**

Conserver à la température ambiante (entre 15 °C et 30 °C).

Les comprimés CLOPIDOGREL doivent être conservés en lieu sûr, hors de la portée et de la vue des enfants. Ne les placez pas près d'un radiateur, sur le rebord d'une fenêtre ou dans un endroit humide. Ne sortez pas les comprimés de leur emballage avant que vous soyez prêt à les utiliser.

**Pour en savoir plus sur CLOPIDOGREL:**

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Lisez la monographie de produit intégrale, rédigée à l'intention des professionnels de la santé. Celle-ci renferme également les renseignements pour le patient sur le médicament. Vous pouvez l'obtenir sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) ou en communiquant avec Pro Doc Ltée au 1-800-361-8559, [www.prodoc.qc.ca](http://www.prodoc.qc.ca) ou [info@prodoc.qc.ca](mailto:info@prodoc.qc.ca).

Le présent dépliant a été préparé par  
Pro Doc Ltée  
Laval, Québec  
H7L 3W9.

Dernière révision: 14 octobre 2021