

**PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS**

**Pr<sup>r</sup> DESVENLAFAXINE**

**Comprimés de desvenlafaxine à libération prolongée  
50 mg et de 100 mg**

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie d'une « monographie de produit » publiée à la suite de l'approbation pour la vente au Canada de DESVENLAFAXINE, et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Ce dépliant n'est qu'un résumé et ne fournit pas tous les renseignements sur DESVENLAFAXINE. Si vous avez besoin de renseignements ou de conseils supplémentaires, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**

**Pourquoi ce médicament est-il utilisé?**

Votre médecin vous a prescrit DESVENLAFAXINE pour le traitement de la dépression. L'administration de ce type de médicaments est le plus sûr et le plus efficace lorsque le patient explique bien à son médecin comment il se sent.

**Comment ce médicament agit-il?**

DESVENLAFAXINE appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN). Il agirait sur deux substances présentes naturellement dans le cerveau : la sérotonine et la noradrénaline.

**Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :** Ne prenez pas DESVENLAFAXINE si :

- Vous êtes allergique (hypersensible) à la desvenlafaxine, à la venlafaxine ou à tout ingrédient de DESVENLAFAXINE.
- Vous prenez ou avez pris au cours des 14 derniers jours un médicament de la classe des inhibiteurs de la monoamine- oxydase (IMAO), y compris le linézolide, un antibiotique, et le bleu de méthylène, une teinture employée lors de certaines interventions chirurgicales. La prise d'un IMAO avec de nombreux médicaments d'ordonnance, y compris DESVENLAFAXINE, peut causer des effets secondaires graves, susceptibles d'être mortels. De plus, après avoir cessé de prendre DESVENLAFAXINE, vous devrez attendre au moins 7 jours avant de prendre

un IMAO (*voir Autres médicaments et suppléments nutritionnels ou à base de plantes*).

- Vous prenez un autre médicament contenant de la venlafaxine ou de la desvenlafaxine.
- Vous prenez des médicaments vendus sur ordonnance ou non, ou encore des suppléments nutritionnels ou à base de plantes; demandez d'abord l'avis de votre médecin (*voir Réactions évoquant le syndrome sérotoninergique ou le syndrome malin des neuroleptiques*).

**Ingrédient médicinal :**

Desvenlafaxine.

**Ingrédients non médicinaux :**

Acide citrique anhydre, silice colloïdale, oxyde de fer rouge Euroxide, hypromellose, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, polyéthylèneglycol, alcool polyvinylique, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer rouge (pour le comprimé à 100 mg), oxyde de fer jaune (pour le comprimé à 50 mg).

**Formes posologiques :**

Les comprimés DESVENLAFAXINE dosés à 50 mg et à 100 mg sont offerts en :

- bouteilles de 30, de 100 ou de 500 comprimés;
- plaquettes alvéolées de 100 comprimés (10 x 10 comprimés).

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

**Apparition ou aggravation de symptômes émotionnels ou comportementaux**

Surtout pendant les premières semaines de traitement ou pendant la période d'ajustement de la dose, un petit nombre de patients qui prennent des antidépresseurs se sentent pires au lieu de se sentir mieux. Par exemple, ils peuvent se sentir agités, hostiles, anxieux ou impulsifs (nouveaux symptômes ou aggravation de symptômes existants) ou encore penser au suicide, à se faire du mal ou à faire mal à quelqu'un d'autre. Les idées et les comportements suicidaires peuvent se manifester dans tous les groupes d'âge, mais surtout chez les patients de 18 à 24 ans. Si c'est votre cas ou le cas de la personne dont vous vous occupez, **consultez immédiatement un médecin**. L'observation étroite du patient par un médecin est nécessaire dans ce cas. **Ne décidez pas vous-même d'interrompre la prise du médicament.**

Les personnes qui ont déjà pensé à se faire du mal sont plus susceptibles d'avoir à nouveau de telles idées.

Il serait bon d'informer un parent ou un ami proche que vous souffrez de dépression et de lui faire lire le présent feuillet. Vous pouvez lui demander de vous avertir s'il remarque que vos symptômes s'aggravent ou s'il est inquiet au sujet de changements dans votre comportement.

La prise de DESVENLAFAXINE peut augmenter votre risque de troubles sexuels, et ce, même après l'arrêt de DESVENLAFAXINE. Informez votre médecin si vous présentez des symptômes tels qu'un dysfonctionnement sexuel, des troubles de l'éjaculation (pour les hommes), une absence d'éjaculation (pour les hommes), une diminution de la libido ou une anorgasmie (difficulté à atteindre l'orgasme).

#### **Ne pas utiliser chez l'enfant**

Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne doivent pas prendre DESVENLAFAXINE.

#### **Risque de fracture**

Si vous êtes âgé, si vous souffrez d'ostéoporose ou que vous avez d'autres facteurs de risque importants de fracture, la prise de DESVENLAFAXINE peut augmenter votre risque de fracture.

Vous devez faire très attention de ne pas tomber, surtout si vous vous sentez étourdi ou que votre pression est basse.

#### **Autres médicaments et suppléments nutritionnels ou à base de plantes**

- Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, qu'ils vous aient été prescrits ou non, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Évitez de prendre **DESVENLAFAXINE** avec un autre médicament contenant de la venlafaxine ou de la desvenlafaxine.
- Votre professionnel de la santé décidera si vous pouvez prendre **DESVENLAFAXINE** avec d'autres médicaments.

#### **Glaucome à angle fermé**

**DESVENLAFAXINE** peut entraîner une crise aiguë de glaucome. Un examen des yeux avant de commencer à prendre **DESVENLAFAXINE** pourrait vous aider à établir si vous risquez de souffrir de glaucome à angle fermé. Obtenez une aide médicale d'urgence si vous éprouvez :

- de la douleur dans les yeux;
- des modifications de la vision;

- de l'enflure ou de la rougeur touchant l'intérieur ou le contour de l'œil.

#### **Autres problèmes médicaux**

**Avant de prendre DESVENLAFAXINE, informez votre médecin ou votre pharmacien si :**

- Vous prenez d'autres médicaments ou des suppléments nutritionnels ou à base de plantes (*voir Autres médicaments et suppléments nutritionnels ou à base de plantes* et Syndrome sérotoninergique).
- Vous faites ou avez fait de l'hypertension artérielle.
- Vous avez ou avez eu des problèmes cardiaques.
- Vous avez un rétrécissement ou une obstruction dans votre tube digestif (œsophage, estomac, intestin grêle ou gros intestin).
- Vous avez ou avez eu des convulsions.
- Vous avez ou avez eu de faibles taux de sodium dans votre sang.
- Vous souffrez d'un trouble de la coagulation ou on vous a déjà dit que vous aviez un nombre insuffisant de plaquettes.
- Vous avez eu une fracture récemment, vous faites de l'ostéoporose ou avez des facteurs de risque d'ostéoporose.
- Vous avez ou avez eu un taux élevé de cholestérol.
- Vous ou un membre de votre famille souffrez de manie ou de trouble bipolaire.
- Vous avez des problèmes de rein.
- Vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir, ou vous allaitez.

Si l'une ou l'autre de ces conditions s'applique à vous, discutez-en avec votre médecin avant de prendre **DESVENLAFAXINE**.

#### **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**N'utilisez pas DESVENLAFAXINE si vous prenez un inhibiteur de la monoamine oxydase ou en avez pris un dernièrement.**

**DESVENLAFAXINE** peut avoir un effet sur les résultats de certains tests de laboratoire. Si vous recevez des rapports d'analyse dont les résultats sont inhabituels, parlez-en à votre médecin.

Vous devez le dire à votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments (médicaments d'ordonnance ou en vente libre, remèdes naturels ou plantes médicinales), en particulier :

- Inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), y compris le linézolide, un antibiotique, et le bleu de méthylène, une teinture employée lors de certaines interventions chirurgicales – Ne prenez pas **DESVENLAFAXINE** avec un IMAO ou dans les 14 jours suivant l'arrêt d'un tel traitement. La prise d'un IMAO avec de nombreux médicaments d'ordonnance, y compris **DESVENLAFAXINE**, peut causer des effets secondaires graves, susceptibles d'être mortels. De plus, après avoir cessé de prendre **DESVENLAFAXINE**, vous devrez attendre au moins 7 jours avant de prendre un IMAO.
- Certains médicaments susceptibles d'influencer la coagulation et d'augmenter les saignements, comme les anticoagulants oraux (p. ex. la warfarine, le dabigatran), l'aspirine et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (p. ex. l'ibuprofène).
- D'autres médicaments contenant de la venlafaxine ou de la desvenlafaxine.

**Réactions évoquant le syndrome sérotoninergique ou le syndrome malin des neuroleptiques** – Des réactions rares, mais potentiellement mortelles, évoquant le syndrome sérotoninergique ou le syndrome malin des neuroleptiques, pouvant causer des perturbations graves du fonctionnement du cerveau, des muscles et de l'appareil digestif, peuvent résulter de l'utilisation de **DESVENLAFAXINE** en même temps que certains médicaments, notamment :

- les triptans utilisés pour traiter les migraines;
- des médicaments utilisés pour traiter des troubles de l'humeur ou de la pensée, y compris les tricycliques, le lithium, les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN), et les antagonistes de la dopamine, y compris les antipsychotiques;
- les amphétamines;
- la sibutramine;
- certains médicaments pour traiter la douleur : fentanyl (utilisé en anesthésie ou pour traiter la douleur chronique), tramadol, tapentadol, mépéridine, méthadone, pentazocine;
- certains médicaments contre la toux, comme le dextrométhorphan;
- le millepertuis;
- les IMAO (y compris le linézolide, un antibiotique, et le bleu de méthylène, une teinture parfois injectée avant une intervention chirurgicale pour guider le chirurgien);

- les suppléments de tryptophane.

Avant de prendre **DESVENLAFAXINE** en même temps que l'un des médicaments mentionnés ci-dessus, discutez avec votre professionnel de la santé du risque de réactions évoquant le syndrome sérotoninergique ou le syndrome malin des neuroleptiques.

Les réactions évoquant le syndrome sérotoninergique ou le syndrome malin des neuroleptiques peuvent se manifester, entre autres, par les signes et les symptômes suivants :

agitation (excitabilité, nervosité), hallucinations, confusion, manque de coordination, secousses ou raideurs musculaires, accélération du rythme cardiaque, augmentation de la température corporelle, changement rapide de la tension artérielle, augmentation des réflexes, diarrhée, coma, nausées, vomissements.

Si vous croyez avoir un syndrome sérotoninergique, consultez un médecin le plus rapidement possible.

**Médicaments agissant sur le système nerveux central** – La prudence est conseillée quand on prend **DESVENLAFAXINE** avec d'autres médicaments ou substances agissant sur le système nerveux central, comme l'alcool et les sédatifs (benzodiazépines, opiacés, antipsychotiques, phénobarbital et antihistaminiques sédatifs). Si vous prenez l'un de ces médicaments, informez-en votre médecin.

Vous devriez éviter de consommer de l'alcool tant que vous prenez **DESVENLAFAXINE**.

**Remplacement d'autres antidépresseurs**  
Des effets secondaires associés à l'arrêt de médicaments antidépresseurs sont survenus chez des patients qui ont changé leur antidépresseur, dont la venlafaxine, pour **DESVENLAFAXINE**. Il se peut que votre médecin diminue graduellement la dose de votre antidépresseur initial afin de réduire ces effets secondaires.

## **BON USAGE DU MÉDICAMENT**

Prenez toujours **DESVENLAFAXINE** exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a demandé. Si vous avez des questions, posez-les à votre professionnel de la santé.

**DESVENLAFAXINE** doit être pris par la bouche.

- **DESVENLAFAXINE** doit être pris environ à la même heure chaque jour, avec ou sans nourriture. Les comprimés doivent être avalés

entiers avec un liquide, sans être coupés, écrasés, mâchés ou dissous, car ils libèrent le médicament de manière contrôlée.

- DESVENLAFAXINE est préparé à partir d'une matrice inerte de comprimé qui libère lentement le médicament dans votre corps. Vous pourriez voir dans vos selles quelque chose qui ressemble à un comprimé, mais il ne s'agit en fait que d'une matrice vide. Il n'y a pas lieu de vous en inquiéter ni de prendre un comprimé supplémentaire. Lorsque vous pouvez apercevoir la matrice, votre corps a déjà absorbé le médicament qu'elle renfermait.

Ne cessez pas de prendre **DESVENLAFAXINE** avant d'en avoir parlé à votre médecin.

**Posologie habituelle :**

La dose habituelle est de 50 mg une fois par jour. Votre médecin pourra augmenter la dose si vous en avez besoin.

**Surdose :**

Si vous croyez avoir pris trop de **DESVENLAFAXINE**, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes. Apportez votre médicament pour le montrer au médecin.

**Dose oubliée :**

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Par contre, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante comme d'habitude. Ne doublez pas une dose pour compenser un oubli.

**Ce que vous devez faire avant d'arrêter de prendre DESVENLAFAXINE**

N'arrêtez pas de prendre **DESVENLAFAXINE** et n'en changez pas la dose sans en avoir discuté au préalable avec votre professionnel de la santé. Ce dernier pourrait vouloir diminuer progressivement votre dose de **DESVENLAFAXINE** pour permettre de prévenir des effets secondaires. Certaines personnes qui ont cessé soudainement de prendre **desvenlafaxine** après plus d'une semaine de traitement ont présenté des étourdissements, des nausées, des maux de tête, de l'irritabilité, de l'insomnie, de la diarrhée, de l'anxiété, des rêves anormaux, de la fatigue ou de la transpiration. D'habitude, ces symptômes ne sont pas graves et disparaissent en quelques jours. Si les symptômes vous dérangent, vous devriez demander conseil à votre médecin.

**Grossesse et allaitement**

L'innocuité de **DESVENLAFAXINE** durant la grossesse n'a pas été prouvée. La desvenlafaxine se retrouve dans le lait humain. Si vous devenez enceinte, si vous essayez de le devenir ou si vous allaitez, informez-en immédiatement votre médecin. Si vous devenez enceinte pendant votre traitement par **DESVENLAFAXINE**, ne cessez pas de le prendre avant d'avoir consulté votre médecin.

Des rapports de post-commercialisation indiquent que certains nouveau-nés exposés à un inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN), à un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS) ou à un autre antidépresseur récent pendant leur développement fœtal ont présenté, à la naissance, des complications qui ont entraîné une hospitalisation prolongée de même que le recours à une aide respiratoire et à une alimentation par sonde. Les symptômes suivants ont été signalés : problèmes d'alimentation ou difficultés respiratoires, convulsions, rigidité ou relaxation musculaire excessive, énervement et pleurs constants. Ces symptômes résulteraient soit d'effets toxiques directs du médicament sur le bébé soit d'un syndrome lié à l'arrêt brusque du médicament. Les symptômes disparaissent généralement avec le temps. Toutefois, si votre bébé présente l'un de ces symptômes, veuillez communiquer avec votre médecin dès que possible.

**Conduite automobile et utilisation de machines**

Ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de machines avant de connaître les effets de **DESVENLAFAXINE** sur vous. Ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de machines si **DESVENLAFAXINE** produit sur vous un effet qui vous empêche d'effectuer ces activités sans danger.

Pour toute autre question au sujet de ce produit, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE**

Comme tous les médicaments, **DESVENLAFAXINE** peut causer des effets secondaires. Il est possible que vous n'en ressentiez aucun. Les effets secondaires sont mineurs et passagers dans la plupart des cas, mais certains d'entre eux peuvent être graves ou dépendre de la dose. Consultez votre médecin si vous ressentez un des symptômes mentionnés ci-dessous ou d'autres effets secondaires, car il pourrait être nécessaire d'ajuster la dose.

Si une réaction allergique se manifeste (p. ex. rougeur de la peau, urticaire, démangeaisons, enflure des lèvres, du visage, de la langue ou de la gorge, difficulté à respirer, respiration sifflante, essoufflement, éruption cutanée, ampoules cutanées, lésions ou douleur dans la bouche ou les yeux) ou si tout autre effet secondaire sévère ou inhabituel survient, cessez de prendre ce médicament et obtenez des soins médicaux d'urgence immédiatement.

**Fréquence des effets secondaires**

*Très fréquents* (plus de 1 patient sur 10) : nausées, sécheresse de la bouche, étourdissements, insomnie, transpiration, maux de tête, somnolence.

*Fréquents* (plus de 1 patient sur 100, mais moins de 1 patient sur 10) : palpitations, accélération du rythme cardiaque, bourdonnement d'oreilles, vertiges, pupilles dilatées, vision trouble, vomissements, diarrhée, faiblesse, frissons, énervement, irritabilité, perte de poids, gain de poids, augmentation de la tension artérielle, raideur musculosquelettique, tremblements, manque d'attention, sensation de picotements, modification de la perception du goût, absence d'orgasme, anxiété, nervosité, baisse de la libido, rêves anormaux, retard d'éjaculation (chez l'homme), dysfonctionnement érectile (chez l'homme), bâillements, éruption cutanée, bouffées de chaleur, diminution de l'appétit, constipation, fatigue, syndrome de sevrage médicamenteux, anomalies des résultats des analyses du foie.

*Peu fréquents* (plus de 1 patient sur 1 000, mais moins de 1 patient sur 100) : hypersensibilité, augmentation du taux sanguin de cholestérol, de prolactine ou de triglycérides, évanouissement, dépersonnalisation, saignement de nez, chute de la tension artérielle en position debout, mains et pieds froids, perte de cheveux, anomalies de l'orgasme, troubles du mouvement, difficulté à vider sa vessie, difficulté à uriner, présence de protéines dans l'urine, trouble de l'éjaculation (chez l'homme), absence d'éjaculation (chez l'homme), dysfonction sexuelle.

*Rares* (plus de 1 patient sur 10 000, mais moins de 1 patient sur 1 000) : convulsions, baisse du taux de sodium, enflure sous la peau (par exemple, gorge, visage, mains), manie, hypomanie, convulsions, hallucinations, contractions musculaires, sensibilité à la lumière.

**Pour en savoir plus sur les effets secondaires**

Cette liste d'effets secondaires possibles de **DESVENLAFAXINE** n'est pas exhaustive. Appelez votre professionnel de la santé sans tarder si un effet secondaire devient grave, si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans ce dépliant ou si un effet secondaire vous inquiète.

**Symptômes liés à l'arrêt du traitement**

Vous devriez communiquer avec votre médecin avant d'arrêter de prendre **DESVENLAFAXINE**, ou d'en réduire la posologie. Parmi les symptômes survenus après l'arrêt du traitement par desvenlafaxine se trouvent : de la vision, hypertension, étourdissements, nausées, maux de tête, irritabilité, insomnie, diarrhée, anxiété, rêves anormaux, fatigue et transpiration. Avisez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un de ces symptômes ou tout autre symptôme. Celui-ci pourra ajuster la posologie afin de les soulager.

**EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE**

Symptôme/effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Unique ment si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
Fréquent   Hypertension en 3 occasions		✓	
Fréquent   Augmentation de la tension artérielle		✓	
Fréquent   Augmentation du taux de		✓	

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE</b>				
Symptôme/effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé	Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement		
		Uniquement si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
	cholestérol			
Peu fréquent	<b>Réactions allergiques :</b> peau rouge, urticaire, démangeaisons, enflure des lèvres, du visage, de la langue ou de la gorge, difficulté à respirer, respiration sifflante, essoufflement, éruptions cutanées, cloques, plaies ou douleur dans la bouche ou les yeux			✓
Fréquence inconnue	Faible taux de plaquettes : ecchymoses (bleus) ou saignements inhabituels de la peau ou d'autres régions		✓	
Rare	<b>Manie/hypomanie :</b> humeur euphorique ou irritable, réduction du besoin de dormir, pensées accélérées		✓	
Rare	<b>Crises convulsives :</b> perte de conscience et tremblements incontrôlables			✓
Rare	<b>Hypertension grave :</b> maux de tête, battements			✓

<b>EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE</b>				
Symptôme/effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé	Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement		
		Uniquement si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
	cardiaques plus intenses et possiblement plus rapides, douleur à la poitrine, étourdissements, fatigue excessive et vision trouble			
Rare	Mouvements incontrôlables du corps ou du visage		✓	
Rare	<b>Glaucome :</b> enflure ou rougeur à l'intérieur ou autour des yeux, douleur oculaire et changements dans la vision			✓
<i>Voir Mises en garde et précautions</i>	<b>Faible taux de sodium dans le sang :</b> fatigue, faiblesse, confusion associée à des muscles douloureux, raides ou non coordonnés		✓	
<i>Voir Mises en garde et précautions</i>	Apparition ou aggravation de troubles émotionnels ou comportementaux		✓	
<i>Voir Mises en garde et précautions</i>	<b>Syndrome sérotoninergique :</b> une combinaison de la plupart ou de tous les symptômes suivants : confusion,			✓

**EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE**

Symptôme/effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Uniquement si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
agitation, transpiration, tremblements, frissons, forte fièvre, réflexe soudain des muscles (secousse), hallucinations, battements cardiaques rapides			

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise de DESVENLAFAXINE, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Gardez le médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Conservez le médicament entre 15 °C et 30 °C. Gardez-le dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas **DESVENLAFAXINE** après la date de péremption figurant sur l'emballage. Cette date correspond au dernier jour du mois indiqué.

Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les eaux usées ni dans les ordures ménagères. Consultez votre pharmacien sur la façon d'éliminer adéquatement les médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

**Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées d'être associées avec l'utilisation d'un produit de santé par:

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante->

[canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html](https://www.canada.ca/fr/sante-services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html)) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou

- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

**RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES**

**POUR EN SAVOIR D'AVANTAGE AU SUJET DE DESVENLAFAXINE :**

- Communiquez avec votre professionnel de la santé;
- Lisez la monographie de produit intégrale, rédigée à l'intention des professionnels de la santé celle-ci renferme également les renseignements pour les consommateurs, en visitant le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpbdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche>). ou en communiquant avec Pro Doc Ltée au 1-800-361- 8559, [www.prodoc.qc.ca](http://www.prodoc.qc.ca) ou [medinfo@prodoc.qc.ca](mailto:medinfo@prodoc.qc.ca).

Ce dépliant a été préparé par :

Pro Doc Ltée, Laval, Québec, H7L 3W9

Dernière révision: 05 décembre 2023