

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr LAMOTRIGINE-25

Pr LAMOTRIGINE-100

Pr LAMOTRIGINE-150

Comprimés de lamotrigine

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **LAMOTRIGINE**, et chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. Ce dépliant est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Consultez votre professionnel de la santé pour discuter de votre problème de santé et du traitement, et demandez-lui s'il existe de nouveaux renseignements au sujet d'**LAMOTRIGINE**.

Mises en garde et précautions importantes

Éruptions cutanées graves

Lors de la prise d'**LAMOTRIGINE**, certaines personnes ont eu des réactions cutanées graves et ont dû se rendre à l'hôpital. Le risque d'éruption cutanée grave est plus grand si vous :

- prenez plus de comprimés que ce que votre médecin vous a prescrit;
- prenez de l'acide valproïque;
- avez des antécédents d'allergie ou d'éruption cutanée à la suite de la prise d'autres médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie.

Les symptômes d'une réaction cutanée grave peuvent comprendre :

- ampoules ou peau qui pèle autour des yeux, des lèvres, de la bouche ou des organes génitaux
- enflure du visage et/ou de la langue
- enflure des ganglions lymphatiques
- urticaire
- fièvre

Chez les enfants, une éruption cutanée grave peut être confondue avec une infection. Si vous ou votre enfant présentez une éruption cutanée et de la fièvre pendant la prise d'**LAMOTRIGINE**, communiquez **immédiatement** avec votre médecin.

Pourquoi LAMOTRIGINE est-il utilisé?

LAMOTRIGINE est utilisé chez les adultes et les enfants (qui pèsent au moins 9 kg) pour maîtriser l'épilepsie. Veuillez suivre à la lettre les recommandations de votre médecin.

Comment LAMOTRIGINE agit-il?

LAMOTRIGINE agit en empêchant votre cerveau de libérer des substances chimiques que l'on pense être à l'origine des convulsions. Cela aide à maîtriser les crises épileptiques.

Quels sont les ingrédients d'LAMOTRIGINE?

Ingrédient médicinaux : Lamotrigine

Ingrédients non médicinaux : Cellulose microcristalline, glycolate d'amidon sodique, laque d'aluminium jaune (comprimés à 100 mg seulement), oxyde de fer jaune (comprimés à 150 mg seulement), silice colloïdale et stéarate de magnésium.

LAMOTRIGINE est offert sous les formes posologiques suivantes :

Comprimés à 25 mg, 100 mg et 150 mg.

Ne prenez pas LAMOTRIGINE si :

- Vous êtes allergique à la lamotrigine ou à tout autre ingrédient d'LAMOTRIGINE (voir [Quels sont les ingrédients d'LAMOTRIGINE?](#)).

Consultez votre professionnel de la santé avant que vous ou votre enfant preniez LAMOTRIGINE, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si vous ou votre enfant :

- Prenez d'autres antiépileptiques.
- Prenez déjà de la lamotrigine ou en avez déjà pris, mais avez dû arrêter d'en prendre.
- Avez déjà eu une éruption cutanée lors d'un traitement antérieur par la lamotrigine ou tout autre médicament antiépileptique.
- Avez déjà eu une méningite.
- Êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Il existe un risque de malformations congénitales associé à l'emploi d'LAMOTRIGINE pendant la grossesse.
- Allaites. Lamotrigine passe dans le lait maternel et peut produire des effets secondaires chez le nourrisson allaité.
- Prenez des contraceptifs oraux ou d'autres produits à base d'hormones destinées aux femmes.
- Souffrez d'une maladie du foie, des reins ou du cœur.
- Avez des antécédents familiaux de mort subite d'origine cardiaque ou souffrez d'un trouble appelé syndrome de Brugada (une maladie génétique qui touche le cœur) ou d'autres troubles cardiaques (y compris des problèmes de rythme cardiaque).
- Consommez de l'alcool régulièrement.
- Présentez ou avez présenté des infections à répétition.

Autres mises en garde à connaître :

Arrêt du traitement : N'arrêtez PAS soudainement de prendre LAMOTRIGINE sans en parler d'abord à votre professionnel de la santé. Si vous le faites, vous risquez d'avoir plus de convulsions. L'arrêt de votre traitement doit être progressif après discussion avec votre professionnel de la santé.

Grossesse : LAMOTRIGINE peut nuire au bébé à naître. Ne prenez LAMOTRIGINE pendant la grossesse que si vous avez parlé des risques avec votre médecin et que vous avez décidé que vous deviez le faire. Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez LAMOTRIGINE, demandez à votre professionnel de la santé comment vous inscrire au Registre nord-américain des grossesses chez les femmes prenant des médicaments antiépileptiques (North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry). Vous pouvez vous inscrire à ce registre en composant le 1-888-233-2334. Le but de ce registre est de recueillir des renseignements sur l'innocuité des médicaments antiépileptiques durant la grossesse. Pour en savoir davantage sur ce registre, vous pouvez consulter le site <http://www.aedpregnancyregistry.org/>.

Pensées et comportements suicidaires : Si, à tout moment, vous avez des idées d'automutilation ou de suicide, communiquez avec un professionnel de la santé ou présentez-vous à l'hôpital **immédiatement**. Il peut être utile de dire à un parent ou à un ami proche comment vous vous sentez et de lui demander de vous prévenir s'il remarque des changements dans votre comportement.

Conduite de véhicule et utilisation de machines : Les personnes dont l'épilepsie n'est pas maîtrisée ne doivent pas conduire de véhicules ni faire fonctionner de machines ou d'appareils. LAMOTRIGINE peut provoquer des étourdissements, une somnolence, des troubles de la coordination et/ou une vision brouillée. Il faut éviter de pratiquer des activités nécessitant une attention particulière tant que vous ne saurez pas comment vous/votre enfant réagissez à LAMOTRIGINE.

Veillez indiquer à votre professionnel de la santé tous les produits de santé que vous ou votre enfant prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels et les produits de médecine douce.

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec LAMOTRIGINE :

- Autres médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, tels que l'acide valproïque (valproate), la carbamazépine, la phénytoïne, le phénobarbital et la primidone;
- Rispéridone, un médicament utilisé pour traiter les troubles psychotiques (par exemple, la schizophrénie, le trouble bipolaire);
- Rifampine, un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes;
- Procainamide, un médicament utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque;
- Metformine, un médicament utilisé pour traiter le diabète;

- Association de lopinavir et de ritonavir, ou d'atazanavir et de ritonavir, des médicaments utilisés dans le traitement du VIH/SIDA;
- Contraceptifs oraux et autres produits à base d'hormones destinées aux femmes;
- Acétaminophène (de rares cas de convulsions ont été signalés);
- Tout médicament qui influe sur votre rythme cardiaque;
- Zonisamide (**non offert au Canada**), un médicament utilisé pour traiter l'épilepsie et la maladie de Parkinson.

Vous ne devez ni commencer ni arrêter la prise de contraceptifs oraux ou d'autres produits à base d'hormones destinées aux femmes sans consulter d'abord votre médecin.

Si vous constatez des changements liés à vos menstruations (p. ex. saignements intermenstruels) pendant que vous prenez LAMOTRIGINE et des contraceptifs oraux ou d'autres produits à base d'hormones destinées aux femmes, informez-en votre médecin le plus rapidement possible.

LAMOTRIGINE peut fausser certains tests de laboratoire visant à détecter la présence d'autres médicaments. Si vous devez vous soumettre à des épreuves de laboratoire, indiquez au professionnel de la santé que vous prenez LAMOTRIGINE.

Comment prendre LAMOTRIGINE :

- Prenez LAMOTRIGINE en suivant exactement les directives de votre professionnel de la santé.
- N'arrêtez pas soudainement de prendre LAMOTRIGINE, car cela peut augmenter le nombre de crises convulsives que vous avez et leur gravité.
- Il est important de respecter vos rendez-vous de suivi médical.
- LAMOTRIGINE peut être pris avec ou sans aliments.

Comprimés : Ils doivent être avalés entiers. Ils ne doivent PAS être croqués ni écrasés.

Posologie habituelle :

Votre professionnel de santé décidera de la meilleure dose d'LAMOTRIGINE pour vous. Il pourra augmenter ou diminuer la dose en fonction de votre réponse au médicament. Suivez attentivement ses directives. Ne modifiez pas votre dose, sauf si votre professionnel de la santé vous le demande.

Surdose :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop d'LAMOTRIGINE, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez de prendre une dose de médicament, prenez-la aussitôt que possible. Toutefois, s'il reste moins de 4 heures avant la prochaine dose, sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne tentez pas de vous rattraper en doublant la dose suivante. Essayez de ne plus faire d'oubli. Demandez conseil à votre professionnel de la santé pour savoir comment recommencer à prendre le médicament même si vous n'avez arrêté que quelques jours.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à LAMOTRIGINE?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous ou votre enfant pourriez ressentir lorsque vous prenez LAMOTRIGINE. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé :

- vision double, vision brouillée;
- maux de tête;
- tremblements, troubles de la coordination;
- étourdissements;
- nausées, vomissements, indigestion;
- douleur thoracique;
- douleur au cou, à l'abdomen ou aux articulations;
- faiblesse ou fatigue;
- somnolence;
- troubles du sommeil (insomnie);
- congestion nasale;
- éruptions cutanées;
- agressivité, agitation ou irritabilité;
- anxiété;
- cauchemars.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
TRÈS FRÉQUENT			
Éruptions cutanées ou rougeurs		√	
FRÉQUENT			
Aggravation des crises convulsives : crises plus fréquentes chez les personnes atteintes d'épilepsie			√

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
RARE			
Méningite aseptique (inflammation de la paroi protectrice du cerveau) : fièvre, nausées, vomissements, maux de tête soudains ou raideur de la nuque, sensibilité extrême à la lumière vive			√
Choréo-athétose (trouble du mouvement) : mouvements anormaux et incontrôlables des muscles pouvant se produire au niveau du visage, des yeux, du nez, de la bouche/langue, du cou, du tronc, des bras ou des jambes	√		
Conjonctivite (infection des yeux) : yeux rouges qui démangent accompagnés d'écoulements, de gonflement et de formation de croûtes sur les paupières		√	
Réactions cutanées graves : fièvre, éruption cutanée grave, enflure des ganglions lymphatiques, symptômes semblables à ceux de la grippe, ampoules et peau qui pèle pouvant apparaître à l'intérieur et autour de la bouche, du nez, des yeux et des parties génitales et s'étendre à d'autres régions du corps			√
Érythème polymorphe (réaction allergique cutanée) : plaques bombées rouges ou violettes à la surface de la peau, possiblement accompagnées de cloques ou de			√

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
croûtes au centre; possiblement accompagnées d'un gonflement des lèvres, de légères démangeaisons ou d'une sensation de brûlure			
TRÈS RARE			
Problèmes sanguins : sensation de grande fatigue, rythme cardiaque rapide, essoufflement, faiblesse musculaire		√	
Lymphohistiocytose hémophagocytaire (LH) (affection grave causant l'hyperactivité du système immunitaire et pouvant entraîner la mort) : température élevée (fièvre), éruptions cutanées, difficulté à marcher ou à voir, convulsions apparaissant pour la première fois ou survenant plus souvent, grossissement du foie et/ou de la rate s'accompagnant de douleur et/ou de sensibilité dans la partie supérieure de l'estomac, jaunissement de la peau et/ou du blanc des yeux, enflure des ganglions du cou, des aisselles et/ou de l'aîne, saignement et/ou ecchymoses (bleus) survenant plus facilement; teint pâle, fatigue anormale			√
Hallucinations (voir ou entendre des choses qui ne sont pas réellement présentes)		√	
Problèmes rénaux : inflammation des reins ressentie		√	

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
comme une douleur au bas du dos et/ou une douleur au moment d'uriner (néphrite tubulo-interstitielle); elle peut être accompagnée d'une inflammation de l'œil (uvéite) causant de la douleur et/ou des problèmes visuels			
Problèmes de foie : jaunissement de la peau et du blanc des yeux, douleur ou gonflement dans la partie supérieure droite de l'abdomen, nausées ou vomissements, urine foncée inhabituelle, fatigue inhabituelle, perte d'appétit inexplicée		√	
Lymphadénopathie (enflure des ganglions lymphatiques) : enflure du visage ou gonflement des ganglions au cou, aux aisselles ou à l'aîne		√	
Graves troubles de la coagulation sanguine (apparition de petits caillots sanguins dans tout l'organisme) : saignements inattendus ou prolongés, notamment au niveau des gencives ou du nez; enflure avec rougeur ou douleur de la région touchée, ecchymoses (bleus), sang dans l'urine			√
FRÉQUENCE INCONNUE			
Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (syndrome de			√

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
DRESS (réaction cutanée grave pouvant entraîner la mort, pouvant toucher un ou plusieurs organes) : fièvre, éruption cutanée grave, peau qui pèle, ganglions lymphatiques enflés, symptômes semblables à ceux de la grippe, jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, essoufflement, toux sèche, douleur ou gêne dans la poitrine, sensation de soif, besoin moins fréquent d'uriner, urine moins abondante			
Insuffisance multi-organique (insuffisance simultanée de plusieurs organes tels que les poumons, les reins et le cœur, pouvant entraîner la mort) : nausées ou vomissements, diminution de la production d'urine, gonflement des chevilles et des pieds, douleur à la poitrine, difficultés à respirer (au repos ou à l'effort), convulsions			√
Rhabdomyolyse (dégradation d'un muscle lésé) : sensibilité musculaire, faiblesse, urine rouge-brun (couleur du thé)			√
Idées suicidaires ou pensées autoagressives (voulant se faire du mal)		√	

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui ne figure pas dans cette liste ou qui devient suffisamment gênant pour compromettre vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur ;

ou

- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Conservez les comprimés LAMOTRIGINE au sec, à la température ambiante (de 15 °C à 30 °C), dans des contenants hermétiques et à l'abri de la lumière. Refermez bien le flacon après avoir pris les comprimés dont vous avez besoin.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet d'LAMOTRIGINE :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada : (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>); ou communiquez avec Pro Doc Ltée : 1-800-361-8559, www.prodoc.qc.ca, medinfo@prodoc.qc.ca.

Ce feuillet a été rédigé par Pro Doc Ltée.
Laval (Québec) H7L 3W9

Dernière révision : 27 décembre 2024